

ชื่อสามัญ :

โทพราเมโซน (topramezone 33.6% SC)

กลุ่มสารเคมี :

Benzoyl pyrazole

กลุ่มสารตาม
HRAC

F2

ขนาดบรรจุ



6x50 มิลลิลิตร



6x100 มิลลิลิตร



กลไกการออกฤทธิ์

ยับยั้งเอนไซม์ 4-HPPD ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดสี (carotenoid/plastoquinone) พืชจึงแสดงอาการซีดขาว (bleaching)

คุณสมบัติ

กำจัดวัชพืชได้หลากหลายทั้งใบแคบ และใบกว้าง ดูดซึมเข้าได้ทั้งทางรากและใบ เคลื่อนย้ายไปทั่วทั้งต้น ทั้งจากใบสู่ราก และรากสู่ใบ ปลอดภัยต่อข้าวโพดทุกชนิด "ฉีดทับยอดได้" ใช้ได้ทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฟอ-แมพันธุ์สำหรับผลิตเมล็ด

พืช	วัชพืช	อัตราการใช้	วิธีใช้
ข้าวโพด	*ประเภทใบแคบ เช่น หญ้าหางนกยูงใหญ่ หญ้าตีนติด หญ้าหนัสนิยม และหญ้าตีนนก *ประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยหิน ผักโขมหิน และหญ้าหาง	15-20 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ อัตรา 4-5 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน	พ่นหลังปลูกข้าวโพด 14-21 วัน หรือ วัชพืช มีจำนวนใบ 3-5 ใบ
อ้อย	*ประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนนก หญ้านกสนิยม หญ้าหางนกยูงใหญ่ และหญ้าปากควาย *ประเภทใบกว้าง เช่น ผักโขมหิน ถั่วลิสงนา และหญ้าขัดใบป้อม	20 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ อัตรา 3-4 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน	พ่นหลังปลูกอ้อย 1-2 เดือน หรือ วัชพืช มีจำนวนใบ 3-5 ใบ