

ชีเซอร์®

ชื่อสามัญ :

เพรทิลาคลอร์ (pretilachlor) 30% W/V EC

กลุ่มสารเคมี :

Chloroacetamide

กลุ่มสารตาม
HRAC

K3

ขนาดบรรจุ



12x1 ลิตร



กลไกการออกฤทธิ์

เข้าไปยับยั้งการแบ่งเซลล์บริเวณเนื้อเยื่อเจริญของพืช กลุ่มยับยั้งจุดเจริญบริเวณยอด

คุณสมบัติ

เป็นสารกำจัดวัชพืชแบบเลือกทำลายในกลุ่ม chloroacetamide มีฤทธิ์ดูดซึมเข้าทำลายยอดอ่อนของวัชพืชที่เพิ่งงอก ใช้ก่อนวัชพืชงอกหรือวัชพืชเริ่มงอก ปลอดภัยต่อข้าว ข้าวไม่หจิก ไม่แดง ไม่งั้น พ่นได้ทั้งนาที่ดอนและนาที่ลุ่ม

คุณประโยชน์

กำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก และหญ้าดอกขาว
วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา และวัชพืชตระกูลกก เช่น กกขนาก กกทราย และหนวดปลาชุก

คำแนะนำ

ใช้ก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence)
ในข้าวนาหว่านน้ำตม พ่นระยะ 0-4 วัน
หลังหว่านข้าว แล้วไถน้ำเข้านา 2-3 วัน
และรักษาระดับน้ำให้สม่ำเสมอ

อัตราการใช้



สาร 300-400
มิลลิลิตร



75-100
มิลลิลิตร

ผสม น้ำ



60-80
ลิตร

15-20
ลิตร



พื้นที่ 1 ไร่

พื้นที่ 1 งาน



พืช

ข้าว

หลังหว่านข้าว 1 วัน และรดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน