

อิการ์

ชื่อสามัญ :

โทอะมีทอกแซม (thiamethoxam) 25% WG

กลุ่มสารเคมี :

neonicotinoid

กลุ่มสารตาม
IRAC

4A

ขนาดบรรจุ



60 x 100 กรัม



กลไกการออกฤทธิ์

สารเคมีจะเลียนแบบการทำงานของอะซิติลโคลีนและไปเกาะตรงจุดรับแทนทำให้เอ็นไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรส ย่อยสลายได้ยากกว่าการย่อยสลายอะซิติลโคลีน

คุณสมบัติ

สารกำจัดแมลงชนิดดูดซึม เข้าทางใบ และทางรากพืช

คุณประโยชน์

ใช้กำจัดแมลงปากดูด เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น

คำแนะนำ

สามารถใช้รดกล้าพืชก่อนย้ายปลูก เพื่อป้องกันแมลงปากดูด ในระยะกล้าได้ดี

อัตราการใช้



10 กรัม

ผสม



20 ลิตร

พืช



- ข้าว
- พืชไร่
- ไม้ดอก
- ไม้ผลและผักต่างๆ



เพลี้ยไฟในทุเรียน



เพลี้ยไฟ



เพลี้ยจักจั่น