

# พาบีนส์®

ชื่อสามัญ :

ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin) 25% W/V EC

กลุ่มสารเคมี :

Strobilurin type : Methoxy-carbamates

กลุ่มสารตาม  
FRAC

11

ขนาดบรรจุ



30x100 มิลลิลิตร  
24x250 มิลลิลิตร  
12x500 มิลลิลิตร



## กลไกการออกฤทธิ์

ยับยั้งการหายใจของเชื้อราโดยการยับยั้ง mitochondrial cytochrome b และบล็อกการถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่าง cytochrome b และ cytochrome c

## คุณสมบัติ

เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดดูดซึม

## คุณประโยชน์

สามารถป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างกว้างขวาง

## คำแนะนำ

ใช้ต่อเนื่องไม่เกิน 2 ครั้ง  
เพื่อป้องกันการดื้อยา สามารถ  
กำจัดเชื้อราได้ทั้งที่อยู่บนใบพืช  
และอยู่ในเนื้อเยื่อพืช

อัตราการใช้



สาร



15

มิลลิลิตร

ผสม

น้ำ



20 ลิตร

พืช



พืชไร่ ผัก ไม้ผล  
และไม้ดอก



โรคใบไหม้แผลใหญ่ในข้าวโพด



โรคต้นแตกยางไหลในแคนตาลูป

พืช	โรค	อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตร	วิธีใช้
องุ่น	สแคป	15 มิลลิลิตร	พ่นทุก 7 วันหลังจากตัดกิ่ง องุ่นได้ 13 วัน
ข้าวโพดหวาน	ใบไหม้แผลใหญ่	10-20 มิลลิลิตร	พ่นเมื่อพบโรค ทุก 7 วัน
แคนตาลูป	ยางไหล		