

บลาสเบน®

ชื่อสามัญ :

ไตรโซคลาโซล (tricyclazole) 75% WP

กลุ่มสารเคมี :

Triazolobenzo-thiazole

กลุ่มสารตาม
FRAC

16.1

ขนาดบรรจุ



60x100 กรัม
40x250 กรัม



กลไกการออกฤทธิ์

ยับยั้งการสังเคราะห์ melanin ของเชื้อราสาเหตุโรคพืช ทำให้สปอร์เมื่องอกแล้วไม่สามารถเจาะเข้าผนังเซลล์พืชได้

คุณสมบัติ

เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดดูดซึม เข้าทางใบ และราก สามารถเคลื่อนย้ายในพืชได้ดี

คุณประโยชน์

ใช้ป้องกันกำจัดโรคไหม้ และโรคเน่าคอรวงในข้าว

คำแนะนำ

มีระยะเวลาปลอดฝน 1 ชั่วโมง
ใช้คลุมเมล็ดข้าวเพื่อป้องกัน
โรคไหม้ในระยะกล้าได้

อัตราการใช้



สาร



10-15
กรัม

ผสม



20 ลิตร

พืช



ข้าว



โรคใบไหม้ในข้าว

พืช	โรค	อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตร	วิธีใช้
ข้าว	โรคไหม้และโรคเน่าคอรวง	10-15 กรัม	พ่นเมื่อพบโรค ทุก 7 วัน