

มาโมมิกรี โกลด์

กลุ่มสาร :

ผลิตภัณฑ์สารเพิ่มประสิทธิภาพพืช

สารสำคัญ

Polysaccharide 22%

Total L-Amino 10%

ขนาดบรรจุ



12x1,000 มิลลิลิตร



4x5 ลิตร



คุณสมบัติ

ประกอบด้วยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว และอะมิโน ซึ่งพืช จะนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของเซลล์ และใช้ในการเจริญเติบโตของรากและลำต้น พืชจึงสามารถดูดซึ่ม และนำไปใช้ได้ทันทีทั้งทางใบ และทางราก มาโมมิกรี โกลด์สามารถเพิ่มแป้ง และน้ำตาลให้แก่พืชโดยตรง และรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง จึงช่วยให้พืชฟื้นตัว หลังเก็บเกี่ยว ได้รวดเร็วหรือ พืชสามารถนำอาหารไปใช้ได้ทันที ในช่วงที่พืชขาดแคลน และช่วงที่พืชต้องการอาหารสะสมในต้น

คุณประโยชน์

- เพิ่มการออกดอก และเพิ่มปริมาณการติดผลผลิต
- เพิ่มความแข็งแรงของรากฝอย และการเป็นประโยชน์ของ ไนโตรเจน
- เพิ่มน้ำตาลที่ใบ ขณะที่มีความเข้มข้นแสงต่ำ ป้องกันการดึงน้ำตาลจากผล
- ทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ ในขบวนการแบ่ง และขยายขนาดเซลล์เพิ่มการสร้างเนื้อผล
- ช่วยให้ผลโตไว ผลสวย
- ช่วยให้ใบอ่อนแก่เร็ว ในขณะที่มีใบอ่อนจำนวนมาก มีผลต่อการฟื้นต้นหลังเก็บเกี่ยว
- เพิ่มการสังเคราะห์แสงช่วยในกระบวนการสร้างโปรตีนและน้ำตาล ในการสะสมอาหาร


พืช



- ข้าว
- ผักต่างๆ
- ไม้ผล
- พืชทุกชนิด



ส้ม



แตงโม

พืช	อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตร	วิธีใช้และประโยชน์
ส้ม มะนาว ทุเรียน ลำไย มะม่วง ไม้ผลต่าง	20-30 มิลลิลิตร	<ul style="list-style-type: none"> - ฉีดพ่นช่วงสะสมอาหาร เพื่อการออกดอก - ฉีดพ่นก่อนดอกบาน ช่วยในการติดดอก เพิ่มการติดผล - ฉีดพ่นช่วงติดผล ช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิต และเพิ่มขนาดผล
ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา มะเขือต่างๆ มะระ พืชตระกูลแตง	10-20 มิลลิลิตร	<ul style="list-style-type: none"> - ฉีดพ่นหลังย้ายกล้า ช่วยให้พืชฟื้นตัวเร็ว และโตไว - ฉีดพ่นก่อนดอกบาน ช่วยในการติดดอก เพิ่มการติดผล - ฉีดพ่นช่วงติดผล ช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิต และเพิ่มขนาดผล
ไม้ดอก ไม้ประดับ	10-20 มิลลิลิตร	<ul style="list-style-type: none"> - ฉีดพ่นหลังปลูก 10-20 วัน ช่วยให้พืชฟื้นตัวเร็ว และโตไว - ฉีดพ่นอีก ทุก 7-14 วัน ช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิต - ฉีดพ่นช่วงกำลังแทงช่อดอก และออกดอก ช่วยให้สีสวย สดใส
พริก ผักกินผล พืชผักตระกูลกะหล่ำ	10-20 มิลลิลิตร	<ul style="list-style-type: none"> - ฉีดพ่นหลังย้ายกล้า หรือถอนแยก ช่วยให้พืชฟื้นตัวเร็วและโตไว - ฉีดพ่นก่อนดอกบาน ช่วยในการติดดอก เพิ่มการติดผล - ฉีดพ่นช่วงติดผล ช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิต และเพิ่มขนาดผล
นาข้าว และพืชไร่	10-20 มิลลิลิตร	<ul style="list-style-type: none"> - ฉีดพ่นช่วงตั้งแต่ก่อนตั้งท้อง จนข้าวออกรวง ทุก 7-14 วัน ช่วยเพิ่มคุณภาพเมล็ดข้าว น้ำหนักดี เมล็ดแกร่ง ไม่แตกหักง่าย